

Tabla III. Resultados Maternos Seleccionados

	<u>HBDP</u> n=862	<u>Atendidos por</u> <u>médicos en</u> <u>hospitales</u> N =743	<u>HBDP vs</u> <u>médicos</u> <u>valor de p</u>	<u>Parteras que</u> <u>atendieron en</u> <u>hospitales</u> n =571	<u>HBDP vs</u> <u>parteras</u> <u>en</u> <u>hospitales</u> <u>valor de p</u>
Hipertensión Inducida por el Embarazo*	10 (1.2)	17 (2.3)	0.08	16 (2.8)	0.02
Laceraciones					
1 ^{er} o 2 ^{do} grado	369 (42.8)	364 (49)	0.01	293 (51.3)	0.002
3 ^{er} or 4 ^{to} grado	19 (2.2)	19 (2.6)	0.64	26 (4.6)	0.02
Periné intacto	474 (55.0)	360 (48.5)	0.009	252 (44.1)	<0.001
Desgarro cervical	1 (0.1)	1 (0.1)	1.0	0	1.0
Prolapso de cordón	1 (0.1)	1 (0.1)	1.0	3 (0.5)	0.30
Desprendimiento de placenta	2 (0.2)	2 (0.3)	1.0	3 (0.5)	0.39
Placenta previa [#]	0	4 (0.5)	0.05	2(0.4)	0.16
Ruptura uterina	0	2 (0.3)	0.21	0	
Prolapso uterino	0	0		1 (0.2)	0.40
Hemorragia posparto (PPH) [§]	38 (4.4)	36 (4.8)	0.67	30 (5.3)	0.52
Transfusión de sangre	3 (0.3)	0	0.25	1(0.2)	1.00
Shock obstétrico	2 (0.2)	0	0.50	0	0.52
Alumbramiento manual	10 (1.2)	11 (1.5)	0.66	7 (1.2)	1.00
Infección	6 (0.7)	22 (3.0)	0.001	20 (3.5)	<0.001

* Preeclampsia leve o inespecífica, preeclampsia severa, o eclampsia documentada en la historia.

[#] Placenta previa y desprendimiento de placenta asintomático no se incluyeron en el grupo comparación debido a que estos no son contraindicaciones absolutas para el nacimiento domiciliario. A estas se las refiere como indicaciones para consulta y traslado de la atención en el *Handbook for Midwives (Manual para Parteras)*.

[§] Hemorragia en la 3^{er} o 4^{ta} etapa del trabajo de parto documentada en la historia.

^{||} Pirexia maternal inexplicada durante el parto con temperatura mayor a 38^oC. en al menos dos ocasiones con seis horas de diferencia: infección del tracto urinario durante la admisión donde el nacimiento se llevó a cabo, infección puerperal mayor; o infección de la herida documentada en la historia clínica.