



Conceptos Esenciales

**Eficacia y Seguridad en Pacientes
con Vejiga Hiperactiva**
Solifenacina



TEMISLOSTALO

Excelencia farmacéutica

1 Reducción de los síntomas de vejiga hiperactiva en ancianos

El tratamiento con solifenacina en pacientes ancianos con vejiga hiperactiva se asocia con la disminución de los síntomas. El fármaco redujo en forma rápida la cantidad de episodios de micción y urgencia urinaria. También se observó la disminución de la frecuencia de la urgencia urinaria luego de 12 semanas de tratamiento. Esta mejoría se acompañó de la reducción de la gravedad del síntoma.

2 Seguridad y tolerancia

El uso de solifenacina con el fin de reducir los síntomas de vejiga hiperactiva se asoció con una frecuencia muy baja de discontinuación. Asimismo, fue poco frecuente la aparición de efectos adversos durante el tratamiento con el fármaco, en tanto que, de acuerdo con la opinión de los expertos, la adhesión terapéutica fue entre buena y excelente.

3 Calidad de vida

Según la opinión de los pacientes con vejiga hiperactiva en tratamiento con solifenacina, el fármaco mejoró el estado clínico general. La mejoría fue significativa luego de 12 semanas de seguimiento en comparación con lo observado al inicio del tratamiento, y coincidió con la disminución significativa de la cantidad de pacientes que consideró que su estado general era desfavorable.

4 Satisfacción del paciente

La urgencia urinaria tiene un efecto negativo y grave sobre el funcionamiento cotidiano. La opinión de los pacientes tratados con solifenacina reflejó una mejoría significativa del desempeño luego de 12 semanas de seguimiento. Este hallazgo coincidió con un nivel considerable de satisfacción por parte de los pacientes que, además, manifestaron conformidad con su estado de salud ante el tratamiento con solifenacina.


5 Disminución del riesgo de caídas

La administración de solifenacina tiene un efecto positivo sobre la urgencia urinaria y la incontinencia de urgencia, con una reducción significativa de ambos síntomas en comparación con el uso de placebo. En pacientes ancianos, esto se traduce en la disminución de la necesidad de evacuar en forma inminente, con la consiguiente reducción potencial del riesgo de caídas y fracturas.

6 Funcionamiento cognitivo

Existe una asociación entre el aumento del riesgo de demencia y el uso de fármacos anticolinérgicos, especialmente en ancianos. El tratamiento con solifenacina no se asoció con un cambio del funcionamiento cognitivo entre los pacientes ancianos con vejiga hiperactiva. Este resultado se observó, aun al evaluar a pacientes con demencia antes del inicio del tratamiento.





Cambio medio del número de episodios sintomáticos de vejiga hiperactiva y del uso de apósitos para incontinencia en pacientes tratados con solifenacina. Todos los síntomas disminuyeron luego de 12 semanas de seguimiento. La cantidad de micciones y episodios urinarios se redujo en forma marcada en aproximadamente 4 episodios en 24 horas.

* Pacientes para los cuales se contó con datos al inicio y a las 12 semanas de tratamiento.

** $p < 0.001$ (prueba de la t pareada).

Referencias

Hampel C, Betz D, Burger M, Nowak C, Vogel M. Solifenacin in the Elderly: Results of an Observational Study Measuring Efficacy, Tolerability and Cognitive Effects. *Urol Int* 98(3):350-357, 2017.

Investigación+Documentación S.A.
 Arias 2624 (C1429DXT) Buenos Aires, Argentina
 Tel.: +54 11 702-1011
 www.siicsalud.com

Los textos de **Conceptos Esenciales, Eficacia y Seguridad en Pacientes con Vejiga Hiperactiva** fueron seleccionados de la base de datos **SIIC Data Bases** por la compañía patrocinante de este ejemplar. El contenido es responsabilidad de los autores que escribieron los textos originales. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio o soporte editorial sin previa autorización expresa de SIIC. Impreso en la República Argentina, abril de 2020. Colección Conceptos Esenciales Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en trámite. Hecho el depósito que establece la Ley N° 11723.