

Medicina del Dolor



Eficacia de Dexketoprofeno Trometamol, Fentanilo y Paracetamol en Pacientes con Cólico Renal

En pacientes internados en sala de guardia por un cólico renal, el tratamiento con dexketoprofeno trometamol, un antiinflamatorio no esteroide, supera en eficacia al uso de fentanilo y paracetamol, en términos de la analgesia y la necesidad de terapia analgésica de rescate.

Gaziantep University, Gaziantep, Turquía

American Journal of Emergency Medicine 36(4):571-576

<http://www.siiic.info/dato/resiic.php/165046>



Abordaje del Dolor en Odontología Implantológica

La ansiedad producida por el dolor posquirúrgico es uno de los factores que suelen asociarse con las cirugías odontológicas, particularmente la colocación de implantes. La administración preventiva de un analgésico no esteroide, como el dexketoprofeno trometamol, puede ser útil para reducir el dolor posquirúrgico en pacientes que reciben implantes dentales.

University of Murcia, Murcia, España

The Journal of Oral Implantology 44(2):122-129

<http://www.siiic.info/dato/resiic.php/165047>



AINE Perioperatorios y Requerimiento de Opioides

Los antiinflamatorios no esteroides administrados en el período perioperatorio disminuyen el requerimiento de opioides en el posoperatorio, cuando se utilizan como parte de una estrategia de analgesia multimodal.

University of Paris VI, París, Francia

Clinical Therapeutics 41(12):2612-2628

<http://www.siiic.info/dato/resiic.php/165048>



Analgesia Multimodal para el Alivio del Dolor Posoperatorio

El control inapropiado del dolor produce malestar en el paciente, con consecuencias fisiológicas y psicológicas. En esta reseña se presentó un enfoque de tratamiento del dolor agudo en el ámbito perioperatorio, sobre la base de la analgesia multimodal.

George Washington University Medical Center, Washington, EE.UU.

Open Journal of Anesthesiology 10(02):47-71

<http://www.siiic.info/dato/resiic.php/164866>



Protocolo de Recuperación Acelerada en el Parto por Cesárea

El protocolo de recuperación acelerada luego de la cirugía en mujeres sometidas a cesárea, se asocia con reducción de la demanda de opioides, la duración de la internación y los costos hospitalarios.

Saint Barnabas Medical Center, Livingston, EE.UU.

Obstetrics & Gynecology 136(4):685-691

<http://www.siiic.info/dato/resiic.php/164623>



Cuidados Paliativos en Pacientes Adultos con Enfermedades Terminales no Relacionadas con el Cáncer

Los cuidados paliativos estarían asociados con tasas reducidas de uso de atención médica y con mayor probabilidad de muerte domiciliaria, en pacientes adultos que fallecen por insuficiencia orgánica crónica, pero no por demencia.

University of Toronto, Toronto, Canadá

BMJ 370(2257):1-11

<http://www.siiic.info/dato/resiic.php/164477>

SKUDEXA[®]



Keral[®]



Fastufrem[®]

