

# Medicina del Dolor




## Eficacia y Seguridad de una Nueva Formulación de Dexketoprofeno Trometamol de Liberación Específica de Sitio

Los comprimidos combinados de minimatriz retardante de liberación específica de sitio de dexketoprofeno trometamol permitirían que este fármaco se administre de manera específica y controlada en las regiones duodenoyeyunal e ileocecal.

October University for Modern Sciences and Arts (MSA), El Cairo, Egipto

*Drug Development and Industrial Pharmacy* 45(11):1777-1787

<http://www.siiic.info/dato/resiic.php/164553>



## El Tramadol no Aumentaría la Eficacia Anestésica del Bloqueo del Nervio Dentario Inferior con Lidocaína

Comparado con placebo, la administración adicional por vía submucosa de tramadol y lidocaína no parecería aumentar la eficacia anestésica del bloqueo del nervio dentario inferior con lidocaína al 2% en molares inferiores con pulpitis irreversible sintomática.

Adiyaman University, Adiyaman, Turquía

*Odontology* 108(3):433-440

<http://www.siiic.info/dato/resiic.php/164554>



## Tramadol Intraperitoneal en Cirugía Abdominal

El tramadol intraperitoneal, en asociación con un analgésico local por la misma vía de administración, es eficaz para el tratamiento del dolor posoperatorio en cirugías abdominales, y reduce el requerimiento de analgésicos en las primeras 24 horas del período posquirúrgico.

University of Auckland, Auckland, Nueva Zelanda

*Journal of Surgical Research* 247:406-412

<http://www.siiic.info/dato/resiic.php/164557>



## Interacciones Farmacológicas y Abordaje del Dolor en Pacientes Polimedicados

El tramadol es un fármaco metabolizado por el sistema enzimático citocromo CYP2D6 para formar un metabolito activo, el cual posee el efecto analgésico. Inhibir su metabolismo tendría impacto en la analgesia de los pacientes. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la administración de antidepresivos inhibidores del CYP2D6 en el abordaje del dolor de pacientes tratados con tramadol.

University Hospitals Portage Medical Center, Ravenna, EE.UU.

*Pharmacotherapy* 39(6):724-729

<http://www.siiic.info/dato/resiic.php/164556>



## Tratamiento del Dolor en la Histeroscopia Diagnóstica Ambulatoria

La histeroscopia ambulatoria es una intervención que se emplea con frecuencia en la actualidad para obtener imágenes del útero que puedan ser utilizadas para el diagnóstico de potenciales anomalías en la zona. El objetivo de este trabajo fue evaluar la seguridad y la eficacia del tramadol en el alivio del dolor durante la histeroscopia diagnóstica en pacientes ambulatorias.

Cairo University, El Cairo, Egipto

*Fertility and Sterility* 113(3):547-552

<http://www.siiic.info/dato/resiic.php/164555>



## Rentabilidad de los Diferentes Métodos de Anestesia en Ginecología

En pacientes sometidas a legrado de la cavidad uterina de manera ambulatoria, la premedicación con dexketoprofeno, en combinación con la anestesia preventiva intraoperatoria con bupivacaína local, se asocia con beneficios económicos en la utilización de recursos humanos, por el acortamiento del tiempo hasta la recuperación de la conciencia y la reducción del tiempo de participación del anestesiólogo.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Járkov, Ucrania

*Georgian Medical News* 287:13-19

<http://www.siiic.info/dato/resiic.php/164560>