



Disfunción Eréctil y Síndrome Metabólico

Los pacientes con síndrome metabólico comparten factores de riesgo entre esta condición y la disfunción eréctil.

Ambas patologías suelen estar asociadas a niveles bajos de testosterona.

Derince Education and Research Hospital, Derince; Okmeydani Training and Research Hospital, Estambul, Turquía

Andrologia 49(9):1-5, Nov 2017

www.siccsalud.com/dato/resicic.php/157418




Tadalafilo Diario o a Demanda en la Disfunción Eréctil

Investigaciones aseguraron que las parejas de los usuarios prefieren la administración de tadalafilo una vez por día sobre los regímenes a demanda y se demostró que brinda mayor espontaneidad en las relaciones sexuales y una actividad sexual más natural.

Baylor College of Medicine, Houston; University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, EE.UU.

Urology 112:6-11, Feb 2018

www.siccsalud.com/dato/resicic.php/157422



Metanálisis Comparativo entre Tadalafilo y Sildenafil para el Tratamiento de la Disfunción Eréctil

El presente metanálisis incluyó trabajos que compararon de manera directa al tadalafilo con el sildenafil (dos inhibidores de la fosfodiesterasa 5) para el tratamiento de la disfunción eréctil. Los dos fármacos son similares en cuanto a eficacia y seguridad.

First Affiliated Hospital of Nanchang University, Nanchang, China

International Urology and Nephrology 49(10):1731-1740, Oct 2017

www.siccsalud.com/dato/resicic.php/157420



Inhibidores de fosfodiesterasa 5 en Ancianos

Los pacientes mayores suelen estar medicados con una polifarmacia que vuelve dificultoso evaluar un fármaco. Los profesionales deben realizar un seguimiento estricto de la eficacia y la seguridad del tadalafilo en esta población.

Hannover Medical School, Hannover, Alemania; University of Alberta, Edmonton, Canadá

BJU International Supplement 119(5):793-803, May 2017

www.siccsalud.com/dato/resicic.php/157419



Tadalafilo para el Tratamiento de los Síntomas del Tracto Urinario Inferior y la Disfunción Eréctil

Este metanálisis indicó que la administración 5 mg de tadalafilo, una vez por día, fue segura, con escasos efectos adversos, y eficaz en el tratamiento de la disfunción eréctil y los síntomas del tracto urinario inferior que indican hiperplasia prostática benigna.

Yantai Yuhuangding Hospital, Yantai, China

Lower Urinary Tract Symptoms 10(1):84-92, Ene 2018

www.siccsalud.com/dato/resicic.php/157423



Agregado de Tadalafilo a la Silodosina para el Tratamiento de la Hiperplasia Prostática Benigna

En el presente estudio retrospectivo y no aleatorizado, el agregado de tadalafilo a la silodosina mejoró los síntomas del tracto urinario inferior en los pacientes con hiperplasia prostática benigna.

Kansai Medical University, Osaka, Japón

Urology 106:153-159, Ago 2017

www.siccsalud.com/dato/resicic.php/157421