




Eficacia del Rivaroxabán para el Tratamiento de Pacientes con Obesidad y Tromboembolismo Venoso (TEV)

Análisis de cohorte de 700 hospitales y 7000 clínicas de EE.UU. (2012-2018)



Rivaroxabán (n = 6755) 

Warfarina (n = 6755) 

Riesgos a los



3 meses

6 meses

12 meses

por comparación de tratamientos

TEV agudo, disminuyó
Sangrado mayor, sin diferencias

El tratamiento con rivaroxabán, en comparación con warfarina, redujo el riesgo de tromboembolismo venoso agudo, sin afectar el índice de hemorragias mayores.

Journal of
**THROMBOSIS and
THROMBOLYSIS**
A Journal for Venous, Arterial and Hemostatic Disorders and Thrombotic Diseases

Effectiveness and Safety of Rivaroxaban
versus Warfarin in Obese Patients ...

51(2):349-358, Feb 2021

DOI: 10.1007/s11239-020-02199-0

Hartford Hospital,
Hartford, EE.UU.

En pacientes con obesidad y eventos de tromboembolismo venoso agudo, la prescripción de rivaroxabán –en comparación con el tratamiento con warfarina– se asocia con riesgo significativamente reducido de recurrencia a los 3, 6 y 12 meses, sin que se incremente el riesgo de sangrado.

Resumen SIIC

Rivaroxabán para el Tratamiento del Tromboembolismo Venoso Agudo en Pacientes con Obesidad



Ingrese al ReSIIC