

Bupropión y Naltrexona en Pacientes con Trastorno por Abuso de Metanfetaminas

ESTUDIO DE DISEÑO ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO, DE DOS FASES Y DE COMPARACIÓN SECUENCIAL PARALELA

Pacientes adultos
con trastorno por
abuso de
metanfetaminas
moderado a grave



Respuesta ponderada en las dos fases:

**Naltrexona
inyectable de liberación
prolongada**

(380 mg cada 3 semanas)



**Bupropión oral de
liberación prolongada**

(450 mg una vez por día)



13.6%



Grupo
Placebo

2,5%

Efecto global del tratamiento de 11.1 puntos porcentuales (prueba de Wald = 4.53; $p < 0.001$)

**EL TRATAMIENTO CON BUPROPIÓN Y NALTREXONA SE ASOCIA
CON ÍNDICES MÁS ALTOS DE RESPUESTA, RESPECTO DE PLACEBO**



The NEW ENGLAND
JOURNAL of MEDICINE

Bupropion and Naltrexone in
Methamphetamine Use Disorder

Enero 14, 2021

DOI:10.1056/NEJMoa2020214

University of Texas, Dallas,
EE.UU.

En pacientes con trastorno por abuso de metanfetaminas, moderado o grave, el tratamiento combinado con naltrexona inyectable de liberación prolongada (380 mg cada 3 semanas), más bupropión de liberación sostenida, por vía oral (450 mg por día) durante 12 semanas, se asocia con índices más altos de respuesta, respecto de placebo.

Resumen SIIC

Bupropión y Naltrexona en Pacientes con Trastorno por Abuso de Metanfetaminas



Ingrese al ReSIIC