


# Eficacia y tolerabilidad de sacubitrilo/valsartán en la insuficiencia cardíaca

Informe de consenso elaborado por la Sociedad Interamericana de Cardiología

## Mecanismo de acción

### Aumento de péptidos natriuréticos




- ✓ Relaja los vasos sanguíneos
- ✓ Modula el sistema nervioso autónomo
- ✗ Inhibe: SRAA, vasopresina, endotelina, citoquinas

## Pacientes



- ▶ Con clase funcional II-IV y pseudoclase funcional I
- ▶ Hospitalizados, compensados
- ▶ Antecedente reciente de internación por IC

## Beneficios



IC, insuficiencia cardíaca; ICFep, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada; ICFer, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; SRAA, sistema renina-angiotensina-aldosterona.

**La combinación sacubitrilo/valsartán puede indicarse para reducir el riesgo de muerte cardiovascular y de internación por insuficiencia cardíaca en la población adulta; especialmente en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, como se demostró en el estudio PARADIGM-HF.**

La evidencia global para el sacubitrilo/valsartán muestra la necesidad de un cambio en el paradigma del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El consenso busca sintetizar la información disponible, de modo de alcanzar el tratamiento óptimo y en el menor tiempo posible para modificar la evolución desfavorable de la enfermedad.

### Resumen SIIC (ReSIIC):

Recomendaciones para el Uso de Sacubitrilo/Valsartán en la Insuficiencia Cardíaca

Texto Completo Autorizado TCA (full text): [https://www.archivoscardiologia.com/frame\\_esp.php?id=642](https://www.archivoscardiologia.com/frame_esp.php?id=642)

